

Bei jeder Wunde ist sofortiges Handeln wichtig – die richtige Versorgung bezieht sich auf die Art und Intensität der Verletzung, durch welche die Wunde entstanden ist.

Grundsätzlich gilt: reinigen, desinfizieren, pflegen.

Wunde	Merkmale	Behandlung	Risiko
 <p>Schnitt- und Stichwunden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Blutung • Wundränder klaffen auseinander • Eingeschränkte Bewegungsfreiheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei kleineren Wunden: Dermaplast Textil Schnellverband • Bei tiefen Wunden: 3M Steri Strip Wundverschlussstreifen 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchtrennung von Sehnen und Nervenbahnen • Starrkrampfisiko durch verunreinigte Gegenstände → Arzt konsultieren
 <p>Platzwunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • An Stellen, wo Haut bzw. Unterhaut direkt auf Knochen liegen • Starke Blutung 	<ul style="list-style-type: none"> • Druckverband oder blutstillende Watte • Nicht klebende Wundauflage wie z.B. Dermaplast Telfa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Blutverlust • Prellungen des umliegenden Gewebes
 <p>Bisswunde</p>	<p>Je nach Art der Bisswunde unterschiedlicher Schweregrad</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desinfektion z.B. mit Octenisept Lösung farblos Spray* • Steril abdecken • Druckverband bei stark blutenden Wunden 	<p>Sollte aufgrund der Infektionsgefahr immer und sofort durch einen Arzt behandelt werden.</p>
 <p>Verbrennung</p>	<p>Je nach Schweregrad Rötung, Schwellung, Blasenbildung, Faustregel: Eine Verbrennung, die grösser als die Handfläche des Betroffenen ist, gehört zum Arzt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mit ca. 15° Celsius kaltem Wasser kühlen • Sonnenbrand: Solarcaïne Lotion* • Verbrennungen ohne offene Haut: lalugen plus Creme* 	<ul style="list-style-type: none"> • Grossflächige Verbrennung • Arbeitsunfälle • Kinder
 <p>Schürfwunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Blutung • Austritt von Wundsekret möglich • Unregelmässige Wundränder 	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen, Fremdkörper entfernen, desinfizieren • Bepanthen plus Spray* zur Desinfektion 	<ul style="list-style-type: none"> • Starke Verunreinigung • Bildung von Eiter
 <p>Blasen</p>	<p>Mit Flüssigkeit gefüllte Verletzungen, die durch Druck oder Reibung entstehen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Geschlossene Blasen mit Pflaster schützen, offene Blasen desinfizieren • Compeed Blasenpflaster 	<p>Infektion bei offenen Blasen</p>
 <p>Umlauf</p>	<p>Entzündung, Rötung, Schwellung, Schmerzen rund um Finger- oder Zehennagel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bäder, Salbenverbände oder lokale Antibiotika • Leucen Zugsalbe* 	<ul style="list-style-type: none"> • Infektion • Blutvergiftung

* Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.